



REHASPRING®

REHASPRING HYPERAKTIVNÍ MOČOVÝ MĚCHÝŘ

- Terapie systémem URIS
- Neuromodulace – neinvazivní a bezpečná terapie
- Efektivní léčba symptomů hyperaktivního močového měchýře

TERAPIE URIS HYPERAKTIVNÍ MOČOVÝ MĚCHÝŘ



CO JE HYPERAKTIVNÍ MOČOVÝ MĚCHÝŘ?

- Hyperaktivní močový měchýř (OAB) způsobuje časté a náhlé nutkání k močení, často spojené s únikem moči. I bez inkontinence je typický neustálý pocit potřeby močit, i když je měchýř téměř prázdný.
- Hlavní symptomy hyperaktivního moč. měchýře (OAB):
 - Časté močení – více než 8× denně
 - Náhlé, silné nutkání močit – těžko odložitelné
 - Urgentní inkontinence – únik moči při náhlém nutkání
 - Noční močení (nykturie) – probouzení kvůli močení víc než jednou za noc

NEUROMODULAČNÍ SYSTÉM URIS:

- Léčí příznaky OAB bez léků
- Jemně stimuluje peroneální nerv pro obnovení kontroly nad močením
- Neinvasivní – bezpečná, pohodlná a účinná
- Zlepšení často již po pár týdnech

JAK TO FUNGUJE?

- Neuromodulační systém URIS stimuluje peroneální nerv pomocí neinvasivní elektrody na kůži, aby pomohl obnovit kontrolu nad močovým měchýřem. Tento nerv je propojen s nervy ovlivňujícími močení a stimulace ovlivňuje nejen je, ale i mozková centra řídící močení. Díky tomu se zlepšuje neuroplasticita a komunikace mezi mozkem a močovým měchýřem.

JAKÝ JE TO POCIT?

- Terapie URIS je pohodlná, nenáročná a většinou i příjemná. Během sezení lze odpočívat, číst nebo poslouchat hudbu. Pacient cítí jen lehké brnění a jemné pohyby chodidel, což je normální součást léčby.

POSTUP TERAPIE

- Léčba začíná šesti 30minutovými sezeními jednou týdně. Následně se doporučuje udržovací terapie jednou za 2 až 4 týdny pro dlouhodobý efekt.

Adresa ordinace:

Krajní 2075
250 88 Čelákovice
tel. 773 552 722



www.rehaspring.cz

Objednávejte se na terapii
ONLINE v systému Medevio 
my.medevio.cz/fyzio-rehaspring

